

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°017	DATA: 29/12/2013
		Revisão: 00	PÁG: 1

AFERIÇÃO DO PERÍMETRO TORÁCICO

ELABORAÇÃO:	Enfº (s): Angelina M ^a Aparecida Alves, Rosana Seabra Lannes, Sylvia Alves Cibreiros, Andreia Paz, Sandra Chaves, Rafael Cordeiro e Márcia Mendes
VALIDAÇÃO:	UTI NEO e enfermaria de nefrologia
REVISÃO:	
APROVAÇÃO:	Enfº Rogério Marques de Sousa

CONCEITO

Ato de medir a circunferência torácica.

FINALIDADE

Conferir parâmetros para avaliação do crescimento do tórax associado a possíveis malformações e patologias.

INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES

Indicação: Admissão do RN Patologias torácicas	
Contraindicação: Não há.	

RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	HORA DE ENF
Médico Enfermeiro	Enfermeiro Técnico de Enfermagem	5 min

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°017	DATA: 29/12/2013
		Revisão: 00	PÁG: 2
AFERIÇÃO DO PERÍMETRO TORÁCICO			
ELABORAÇÃO:	Enfº (s): Angelina M ^a Aparecida Alves, Rosana Seabra Lannes, Sylvia Alves Cibreiros, Andreia Paz, Sandra Chaves, Rafael Cordeiro e Márcia Mendes		
VALIDAÇÃO:	UTI NEO e enfermaria de nefrologia		
REVISÃO:			
APROVAÇÃO:	Enfº Rogério Marques de Sousa		

MATERIAL/EQUIPAMENTOS

- Fita métrica ou trena corporal antropométrica
- Luva de procedimento
- Gaze não estéril
- Álcool 70%
- Álcool a 70% glicerinado

DESCRIÇÃO TÉCNICA

1. Ler a prescrição do paciente;
2. Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH N°01;
3. Separar o material necessário;
4. Fazer desinfecção da fita métrica com gaze embebida em álcool 70% e aguardar secagem espontânea;
5. Identificar-se ao paciente e/ou acompanhante;
6. Checar os dados de identificação na pulseira do paciente conforme o POP CIC (Cuidado Indireto ao Cliente) N° 041;
7. Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;
8. Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário;
9. Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;
10. Calçar as luvas de procedimento, se indicado;
11. Posicionar o paciente em decúbito dorsal;
12. Expor o tórax;
13. Passar a fita métrica em torno do tórax, sob as axilas e sobre a linha dos mamilos, obtendo a medida com a respiração intermediária, no decurso da expiração. A leitura da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC Nº017	DATA: 29/12/2013
		Revisão: 00	PÁG: 3
AFERIÇÃO DO PERÍMETRO TORÁCICO			
ELABORAÇÃO:	Enfº (s): Angelina M ^a Aparecida Alves, Rosana Seabra Lannes, Sylvia Alves Cibreiros, Andreia Paz, Sandra Chaves, Rafael Cordeiro e Márcia Mendes		
VALIDAÇÃO:	UTI NEO e enfermaria de nefrologia		
REVISÃO:			
APROVAÇÃO:	Enfº Rogério Marques de Sousa		

medida encontrada deverá ser obtida no ponto de encontro da fita métrica;

14. Retirar as luvas, caso tenham sido utilizadas;
15. Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;
16. Deixar o paciente confortável;
17. Recolher o material e deixar o ambiente em ordem;
18. Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH Nº 01;
19. Fazer o registro do valor encontrado, assinando e carimbando o relato no prontuário do paciente (técnico de enfermagem na folha de observações de enfermagem e enfermeiro na folha de evolução).

CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Para realizar o procedimento no RN após o nascimento torna-se necessário o uso de luvas de procedimento para evitar contaminação do profissional e do paciente;
- Aproveitar o momento para investigar possíveis anormalidades como assimetria de mamilos; traumatismos; abaulamento uni ou bilateral (sugestivo de pneumotórax).

DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS)

- SCHMITZ, E.M.R. A enfermagem em pediatria e puericultura. Rio de Janeiro. Ed. Atheneu, 2001.
- FIGUEIREDO, N.M.A E VIANA, D.L. Tratado Prático de enfermagem. São Paulo. Ed. Yendis, 2006.