

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°009	DATA: 06/06/2011
		Revisão: 30/12/2012	PÁG: 1

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA RETAL

ELABORAÇÃO:	Enf ^a (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas
VALIDAÇÃO:	
REVISÃO:	Enf ^a : Cilene Bisagni, Claudia Elizabeth de Almeida e Andreia Paz
APROVAÇÃO:	Enf ^o : Rogério Marques de Sousa

CONCEITO

Consiste na administração de medicamentos por via retal, produzindo efeitos locais ou sistêmicos.

FINALIDADE

Administração retal de medicamentos (supositórios), conforme prescrição médica garantindo a segurança do paciente.

INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES

Indicações:

- Efetuar o esvaziamento do conteúdo intestinal, em casos de constipação intestinal
- Utilizar a via retal para absorção medicamentosa sistêmica;
- Evitar a desativação da função medicamentosa pelas enzimas do estômago;
- Evitar a irritação estomacal;
- Administrar medicamentos quando a via oral não é a de eleição.

Contra indicações:

- Pacientes com inflamação local.
- Pacientes com arritmias cardíacas.
- Pacientes com história de infarto agudo do miocárdio.
- Crianças com imunossupressão ou trombocitopenia (pelo risco de infecção ou sangramento).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°009	DATA: 06/06/2011
		Revisão: 30/12/2012	PÁG: 2
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA RETAL			
ELABORAÇÃO:	Enf ^a (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
VALIDAÇÃO:			
REVISÃO:	Enf ^a : Cilene Bisagni, Claudia Elizabeth de Almeida e Andreia Paz		
APROVAÇÃO:	Enf ^o : Rogério Marques de Sousa		

RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	HORA DE ENF
Médico	Enfermeiro e técnico de enfermagem	15 min.

MATERIAL/EQUIPAMENTOS

<ul style="list-style-type: none"> • Bandeja ou cuba rim • Almotolia de álcool à 70% • Almotolia de álcool glicerinado 70% • Luvas de procedimento • Gaze não estéril • 01 tubo de lubrificante hidrossolúvel (Xilocaína gel). • Equipamentos de proteção individual (gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção e avental não estéril) • 01 impermeável • Papel toalha • Comadre • Etiqueta de identificação • Biombo • Gorro • Material para realizar higiene genital, conforme POP CDC N° 064, quando necessário

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°009	DATA: 06/06/2011
		Revisão: 30/12/2012	PÁG: 3
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA RETAL			
ELABORAÇÃO:	Enf ^a (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
VALIDAÇÃO:			
REVISÃO:	Enf ^a : Cilene Bisagni, Claudia Elizabeth de Almeida e Andreia Paz		
APROVAÇÃO:	Enf ^o : Rogério Marques de Sousa		

DESCRIÇÃO TÉCNICA

1. Ler a prescrição do paciente;
2. Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH N°1;
3. Conferir os nove certos da administração de medicamentos;
4. Fazer o rótulo de identificação do medicamento com: nome do paciente, dose, horário, via de administração;
1. Separar uma bandeja ou cuba rim para o procedimento;
2. Fazer desinfecção da bandeja com gaze embebida em álcool 70%, unidirecional, repetindo o movimento três vezes e aguardando secagem espontânea;
3. Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;
4. Separar o material para o procedimento, colocando-o na bandeja;
5. Separar a medicação, colocando-a na bandeja com o rótulo de identificação do medicamento. O medicamento deve ser mantido com sua embalagem própria;
6. Identificar-se ao paciente e acompanhante;
7. Checar os dados de identificação na pulseira do paciente, conforme o POP CIC (Cuidado Indireto ao Cliente) N° 041;
8. Orientar ao paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;
9. Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário;
10. Colocar os equipamentos de proteção individual: gorro, máscara, luva de procedimento, capote não-estéril e óculos de proteção;
11. Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento, colocando-o na posição de Sims (decúbito lateral esquerdo) para evitar a compressão da veia cava inferior;
12. Posicionar o impermeável sob as nádegas;
13. Levantar, com a mão dominante, a nádega superior do paciente para expor o ânus;
14. Introduzir o medicamento via retal;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC Nº009	DATA: 06/06/2011
		Revisão: 30/12/2012	PÁG: 4

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA RETAL

ELABORAÇÃO:	Enf ^a (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas
VALIDAÇÃO:	
REVISÃO:	Enf ^a : Cilene Bisagni, Claudia Elizabeth de Almeida e Andreia Paz
APROVAÇÃO:	Enf ^o : Rogério Marques de Sousa

15. Solicitar que o paciente aguarde o máximo de tempo que conseguir sem evacuar;
16. Colocar o paciente em posição confortável após a administração do medicamento;
17. Realizar a higiene genital, quando necessário, conforme o POP de CDC Nº 064;
18. Retirar os equipamentos de proteção individual;
19. Realizar a higienização das mãos com álcool glicerinado;
20. Manter a organização da unidade do paciente;
21. Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;
22. Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP da CCIH Nº.01;
23. Realizar as anotações necessárias, registrando os efeitos da medicação, assinando e carimbando o relato.

CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Nove certos na administração de medicamentos são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração certa, horário certo, registro certo, devolução certa, orientação e informação certa ao paciente, compatibilidade certa;
- Caso o paciente esteja em precaução de contato seguir as recomendações do POP nº 3 da CCIH;
- Os sinais vitais do paciente devem ser aferidos antes da administração de medicamentos que possam afetá-los (ex: antiarrítmicos, beta bloqueadores, digitálicos, hipotensores, entre outros)
- Manter vigilância, notificar e registrar as possíveis reações adversas ao medicamento administrado;
- Registrar a recusa do paciente e comunicar ao profissional médico;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM	POP CDC N°009	DATA: 06/06/2011
		Revisão: 30/12/2012	PÁG: 5

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA RETAL

ELABORAÇÃO:	Enf ^a (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas
VALIDAÇÃO:	
REVISÃO:	Enf ^a : Cilene Bisagni, Claudia Elizabeth de Almeida e Andreia Paz
APROVAÇÃO:	Enf ^o : Rogério Marques de Sousa

- Quando o medicamento for indicado para aliviar constipação deverá ser retido pelo maior intervalo de tempo possível;
- Quando for realizada a introdução de supositório retal utilize o dedo indicador para direcionar o supositório avançando até que ultrapasse o esfíncter anal interno e contra a mucosa retal, 10 cm (4 polegadas) em adultos, 5 cm (2 polegadas) em crianças;
- Para facilitar a introdução do medicamento pode-se orientar ao paciente para respirar com a boca entre aberta.

DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS)

- BARE, B.G,; SUDDARTH, D.S.. Brunner - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12^a Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
- KOCH. R.M. et. Al. Técnicas básicas de enfermagem. 22^a edição. Curitiba: Século XXI Livros, 2004.
- POTTER, P.A.; PERRY,A.G.. Fundamentos de Enfermagem. 7^a Ed. São Paulo: Elsevier, 2009.
- SILVA LD, PEREIRA SRM, MESQUITA AMF. Procedimentos de enfermagem: Semiotécnica para o cuidado. Rio de Janeiro: Medsi; 2005
- NETTINA SM. Prática de enfermagem. 8^a. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.